重组大鼠 TGFB1 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP52290

蛋白名称：Transforming growth factor beta-1 proprotein [Cleaved into: Latency-associated peptide (LAP); Transforming growth factor beta-1 (TGF-beta-1)]

别名：Tgfb1

UniProt 编号：P17246

UniProt 链接：www.uniprot.org/uniprotkb/P17246/entry

种属来源：大鼠

表达系统：HEK293T 真核细胞表达系统

序列长度：390 AA

分子量：44 KD

蛋白标签：C 端/His6

二、氨基酸序列

MPPSGLRLLPLLLPLPWLLVLTPGRPAAGLSTCKTIDMELVKRKRIEAIRGQILSKLRLASPPSQGEVP
PGPLPEAVLALYNSTRDRVAGESADPEPEPEADYYAKEVTRVLMVDRNNAIYDKTKDITHSIYMFFNT
SDIREAVPEPPLLSRAELRLQRFKSTVEQHVELYQKYSNNSWRYLGNRLLTPTDTPEWLSFDVTGVV
RQWLNQGDGIQGFRFSAHCSCDSKDNVLHVEINGISPKRRGDLGTIHDMNRPFLLLMATPLERAQHL
HSSRHRRALDTNYCFSSTEKNCCVRQLYIDFRKDLGWKWIHEPKGYHANFCLGPCPYIWSLDTQYS
KVLALYNQHNPGASASPCCVPQALEPLPIVYYVGRKPKVEQLSNMIVRSCKCS

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 PBS 缓冲体系，含 50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为 HEK293T 真核细胞表达系统制备的重组 Transforming growth factor beta-1 proprotein [Cleaved into: Latency-associated peptide (LAP); Transforming growth factor beta-1 (TGF-beta-1)]。蛋白产品适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学等科研场景。

蛋白功能：转化生长因子β-1 前体蛋白：是 Latency-associated peptide (LAP)与转化生长因子β-1（TGF-beta-1）链的前体，二者分别构成 TGF-beta-1 的调节亚基与活性亚基；[Latency-associated peptide]：在细胞外基质储存过程中，是维持转化生长因子β-1（TGF-beta-1）链处于潜伏状态所必需的组分。它以非共价键形式与 TGF-beta-1 结合，并通过与 LTBP1、LRRC32/GARP、LRRC33/NRROS 等调控 TGF-beta-1 激活的“微环境分子”相互作用，调节 TGF-beta-1 的激活过程。与 LRRC33/NRROS 的相互作用可调控巨噬细胞与小胶质细胞中 TGF-beta-1 的激活；与 LRRC32/GARP 的相互作用则控制活化调节性 T 细胞（Tregs）表面的 TGF-beta-1 激活；与整合素（ITGAV:ITGB6 或 ITGAV:ITGB8）结合会导致 Latency-associated peptide 链发生构象扭曲，进而释放出活性形式的 TGF-beta-1；[转化生长因子β-1]：是一种多功能蛋白，可调控多种细胞类型的生长与分化，参与正常发育、免疫功能、小胶质细胞功能及神经退行性变应答等多种生理过程（依据相似性推导）。其成熟活化过程需经过多个步骤：高尔基体中对前体蛋白进行切割后，Latency-associated peptide (LAP)与转化生长因子β-1（TGF-beta-1）链仍以非共价键结合，使 TGF-beta-1 在细胞外基质储存期间保持无活性状态（依据相似性推导）。与此同时，LAP 链会与 LTBP1、LRRC32/GARP、LRRC33/NRROS 等调控 TGF-beta-1 激活的“微环境分子”相互作用，使其在细胞外微环境储存期间维持潜伏状态。整合素（ITGAV:ITGB6 或 ITGAV:ITGB8）可将 TGF-beta-1 从 LAP 上释放：整合素与 LAP 结合会稳定 LAP 蝴蝶结尾端的另一种构象，造成 LAP 链扭曲，随后释放出活性 TGF-beta-1（依据相似性推导）。从 LAP 上释放并活化后，TGF-beta-1 通过结合 TGF-beta 受体（TGFBR1 与 TGFBR2）发挥作用，由后者传导信号（依据相似性推导）。尽管 TGF-beta-1 可被多种细胞表达，但得益于 Latency-associated peptide 链（LAP）与“微环境分子”对其激活过程的精细调控，它在细胞环境中的作用范围具有高度局限性（PubMed:2070682）。TGF-beta-1 在骨重塑中发挥重要作用：它是成骨细胞骨形成的强效刺激因子，可促使定向成骨细胞发生趋化、增殖与分化（PubMed:2070682）。它可通过浓度依赖的方式，促进辅助性 T 细胞 17（Th17）或调节性 T 细胞（Treg）的谱系分化（依据相似性推导）：高浓度时，可通过 FOXP3 介导抑制 RORC 并下调 IL-17 表达，从而促进 Treg 细胞发育（依据相似性推导）；低浓度时，与 IL-6、IL-21 协同作用，可诱导 IL-17 与 IL-23 受体表达，从而促进 Th17 细胞分化（依据相似性推导）。它还可通过调控膜内蛋白水解（RIP）激活 CREB3L1，刺激胶原蛋白持续生成；通过诱导 SMAD2/3 磷酸化及后续核转位介导其激活；通过促进 IPO7 介导的磷酸化 SMAD2 核转位及后续靶基因转录，正向调控牙乳头细胞的成牙本质细胞分化（依据相似性推导）；还可诱导多种细胞类型发生上皮-间质转化（EMT）与细胞迁移（依据相似性推导）。

亚细胞定位：[潜伏期相关肽]：分泌型，细胞外间隙，细胞外基质；[转化生长因子β-1]：分泌型。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。