重组小鼠 B2CL1 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP51680

蛋白名称：Bcl-2-like protein 1 (Bcl2-L-1) (Apoptosis regulator Bcl-X)

别名：Bcl2l1, Bcl2l, Bclx

UniProt 编号：Q64373

UniProt 链接：www.uniprot.org/uniprotkb/Q64373/entry

种属来源：小鼠

表达系统：HEK293T 真核细胞表达系统

序列长度：233 AA

分子量：26 KD

蛋白标签：C 端/His6

二、氨基酸序列

MSQSNRELVVDFLSYKLSQKGYSWSQFSDVEENRTEAPEETEAERETPSAINGNPSWHLADSPAV
NGATGHSSSLDAREVIPMAAVKQALREAGDEFELRYRRAFSDLTSQLHITPGTAYQSFEQVVNELFR
DGVNWGRIVAFFSFGGALCVESVDKEMQVLVSRIASWMATYLNDHLEPWIQENGGWDTFVDLYGN
NAAAESRKGQERFNRWFLTGMTVAGVVLLGSLFSRK

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 PBS 缓冲体系，含 50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为 HEK293T 真核细胞表达系统制备的重组 Bcl-2-like protein 1 (Bcl2-L-1) (Apoptosis regulator

Bcl-X)。蛋白产品适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学等科研场景。

蛋白功能：高效的细胞死亡抑制剂。可抑制 caspases 的激活。似乎通过结合电压依赖性阴离子通道（VDAC）并阻止 caspase 激活因子 CYC1 从线粒体膜释放，从而阻断该通道来调控细胞死亡。同时也作为 G2 检查点及有丝分裂过程中胞质分裂进程的调控因子；亚型 Bcl-X(L)还可调控突触前可塑性，包括神经递质的释放与恢复、轴突线粒体的数量，以及突触囊泡簇的大小和数量。在突触刺激过程中，其通过调节线粒体膜 ATP 合酶 F(1)F(0)的活性来提升线粒体的 ATP 供给，并通过与 DMN1L 结合并激活其在突触囊泡中的 GTP 酶活性，从而调控海马神经元中内吞囊泡的回收。或可通过削弱 NLRP1 炎症小体的激活，进而抑制 CASP1 的激活与 IL1B 的释放，以此减轻炎症反应；亚型 Bcl-X(S)则会促进细胞凋亡。

亚细胞定位：线粒体膜；单次跨膜蛋白。核膜；单次跨膜蛋白；细胞质侧。细胞质、细胞骨架、微管组织中心、中心体。注：Ser-49 磷酸化后定位于中心体。；[亚型 Bcl-X(L)]：线粒体内膜。线粒体外膜。线粒体基质。细胞质囊泡、分泌囊泡、突触囊泡膜。细胞质、胞质溶胶。注：神经元受刺激后，以钙调蛋白依赖的方式从胞质溶胶转移至突触囊泡和线粒体膜。；[亚型 Bcl-X(delta-TM)]：细胞质。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。