重组人 CXCR5 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP50240

蛋白名称：C-X-C chemokine receptor type 5 (CXC-R5) (CXCR-5) (Burkitt lymphoma receptor 1) (Monocyte-derived receptor 15) (MDR-15) (CD antigen CD185)

别名：CXCR5, BLR1, MDR15

UniProt 编号：P32302

UniProt 链接：www.uniprot.org/uniprotkb/P32302/entry

种属来源：人

表达系统：HEK293T 真核细胞表达系统

序列长度：372 AA

分子量：42 KD

蛋白标签：C 端/His6

二、氨基酸序列

MNYPLTLEMDLENLEDLFWELDRLDNYNDTSLVENHLCPATEGPLMASFKAVFVPVAYSLIFLLGVIG
NVLVLVILERHRQTRSSTETFLFHLAVADLLLVFILPFAVAEGSVGWVLGTFLCKTVIALHKVNFYCSSL
LLACIAVDRYLAIVHAVHAYRHRRLLSIHITCGTIWLVGFLLALPEILFAKVSQGHHNNSLPRCTFSQEN
QAETHAWFTSRFLYHVAGFLLPMLVMGWCYVGVVHRLRQAQRRPQRQKAVRVAILVTSIFFLCWSP
YHIVIFLDTLARLKAVDNTCKLNGSLPVAITMCEFLGLAHCCLNPMLYTFAGVKFRSDLSRLLTKLGCT
GPASLCQLFPSWRRSSLSESENATSLTTF

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 PBS 缓冲体系，含 50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为 HEK293T 真核细胞表达系统制备的重组 C-X-C chemokine receptor type 5 (CXC-R5) (CXCR-5) (Burkitt lymphoma receptor 1) (Monocyte-derived receptor 15) (MDR-15) (CD antigen CD185)。蛋白产品适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学等科研场景。

蛋白功能：一种可结合 B 淋巴细胞趋化因子（BLC）的细胞因子受体。参与 B 细胞迁移至脾脏和派尔集合淋巴结的 B 细胞滤泡，但不参与迁移至肠系膜或外周淋巴结的 B 细胞滤泡。可能在 Burkitt 淋巴瘤（BL）的淋巴瘤发生和/或 B 细胞分化中发挥调节功能。

亚细胞定位：细胞膜；多次跨膜膜蛋白。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。