重组小鼠 PAR2 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP51474

蛋白名称：Proteinase-activated receptor 2 (PAR-2) (Coagulation factor II receptor-like 1) (G protein-coupled receptor 11) (Thrombin receptor-like 1)

别名：F2rl1, Gpcr11, Gpr11, Par2

UniProt 编号：P55086

UniProt 链接：www.uniprot.org/uniprotkb/P55086/entry

种属来源：小鼠

表达系统：HEK293T 真核细胞表达系统

序列长度：399 AA

分子量：45 KD

蛋白标签：C 端/His6

二、氨基酸序列

MRSLSLAWLLGGITLLAASVSCSRTENLAPGRNNSKGRSLIGRLETQPPITGKGVPVEPGFSIDEFSA
SILTGKLTTVFLPVVYIIVFVIGLPSNGMALWIFLFRTKKKHPAVIYMANLALADLLSVIWFPLKISYHLHG
NNWVYGEALCKVLIGFFYGNMYCSILFMTCLSVQRYWVIVNPMGHPRKKANIAVGVSLAIWLLIFLVTI
PLYVMKQTIYIPALNITTCHDVLPEEVLVGDMFNYFLSLAIGVFLFPALLTASAYVLMIKTLRSSAMDEH
SEKKRQRAIRLIITVLAMYFICFAPSNLLLVVHYFLIKTQRQSHVYALYLVALCLSTLNSCIDPFVYYFVS
KDFRDHARNALLCRSVRTVNRMQISLSSNKFSRKSGSYSSSSTSVKTSY

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 PBS 缓冲体系，含 50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为 HEK293T 真核细胞表达系统制备的重组 Proteinase-activated receptor 2 (PAR-2) (Coagulation factor II receptor-like 1) (G protein-coupled receptor 11) (Thrombin receptor-like 1)。蛋白产品适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学等科研场景。

蛋白功能：与 G 蛋白偶联的胰蛋白酶及胰蛋白酶样酶受体。其功能通过激活多条信号通路介导，包括磷脂酶 C (PLC)、细胞内钙、丝裂原活化蛋白激酶 (MAPK)、I-kappaB 激酶/NF-kappaB 及 Rho。也可被切割后的 F2r/Par1 反式激活。参与炎症反应的调控、固有免疫与适应性免疫的调节，并可作为感染过程中产生的蛋白水解酶的感受器。通常具有促炎作用。在炎症反应中可与 Tlr4（可能还有 Tlr2）协同转导信号，并调控 Tlr3 信号。在建立内皮屏障中发挥保护作用；该活性涉及凝血因子 X。在中性粒细胞外渗过程中调控内皮细胞屏障完整性，可能由 PRTN3 介导的蛋白水解切割后发生。被认为在气道上皮中具有支气管保护作用，但也有研究显示其可通过破坏 E-钙粘蛋白的黏附作用损伤气道上皮屏障。参与血管张力的调节；激活后可导致低血压，推测由血管舒张介导。可与 G 蛋白α亚基的一个亚群结合，如 GNAQ、GNA11、GNA14、GNA12 及 GNA13，但可能不与 G(o)-alpha、G(i)亚基α-1 及 G(i)亚基α-2 结合。属于 B 类受体，可与 arrestin 形成复合物发生内吞并随之转运至内体囊泡，推测为脱敏状态的受体，该过程可持续较长时间。通过与 GNAQ 及 GNA11 偶联介导对 TNF 刺激的 JNK 磷酸化的抑制；该功能涉及 Ripk1 与 Tradd 从 Tnfr1 上的解离。介导核因子 NF-kappa-B RELA 亚基在'Ser-536'位点的磷酸化；该功能涉及 Ikbkb，且主要不依赖于 G 蛋白。参与细胞迁移。通过 beta-arrestin 促进的支架参与细胞骨架重排及趋化作用；该功能不依赖于 GNAQ 及 GNA11，涉及促进 cofilin 的去磷酸化及肌动蛋白丝的切割。诱导 Cops5 从质膜重新分布至胞质，且 JNK 级联反应的激活由 Cops5 介导。参与白细胞向炎症部位的募集，是能够调控嗜酸性粒细胞功能（如促炎细胞因子分泌、超氧化物生成及脱颗粒）的主要 PAR 受体。炎症过程中可促进树突状细胞成熟、向淋巴结迁移及后续的 T 细胞激活。参与固有免疫细胞的抗菌应答；激活后可增强对革兰氏阳性菌的吞噬作用及对革兰氏阴性菌的杀伤作用。在增强抗病毒应答中与干扰素-γ协同作用。介导由凝血因子 Xa (F10)触发的成纤维细胞中促炎及促纤维化应答的激活（PubMed:18202198）。可能介导由凝血因子 Xa (F10)触发的内皮细胞中屏障保护性信号应答的激活。

亚细胞定位：细胞膜；多次跨膜蛋白。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。