重组大鼠 TRAF6 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP52183

蛋白名称：TNF receptor-associated factor 6 (EC 2.3.2.27) (E3 ubiquitin-protein ligase TRAF6) (RING-type E3 ubiquitin transferase TRAF6)

别名：Traf6

UniProt 编号：B5DF45

UniProt 链接：www.uniprot.org/uniprotkb/B5DF45/entry

种属来源：大鼠

表达系统：HEK293T 真核细胞表达系统

序列长度：530 AA

分子量：60 KD

蛋白标签：C 端/His6

二、氨基酸序列

MSLLNCENSCASSQSSSDCCAAMANSCSAAMKDDSVSGCVSTGNLSSSFMEEIQGYDVEFDPPLE
SKYECPICLMALREAVQTPCGHRFCKACITKSIRDAGHKCPVDNEILLENQLFPDNFAKREILSLTVKC
PNKGCVQKMELRHLEDHQVHCEFALVICPQCQRFFQKCQINKHIIEDCPRRQVSCVNCAVPMPYEE
KEIHDQSCPLANIICEYCGTILIREQMPNHYDLDCPTAPVPCTFSVFGCHEKMQRNHLARHLQENTQL
HMRLLAQAVHNVNLSLRPCDASSPSRGCRPEDPNYEETVKQLEGRLVRQDHQIRELTAKMETQSM
HVSELKRTIRSLEDKVAEMEAQQCNGIYIWKIGNFGMHLKSQEEERPVVIHSPGFYTGRPGYKLCMR
LHLQLPTAQRCANYISLFVHTMQGEYDSHLPWPFQGTIRLTILDQSEAVIRQNHEEVMDAKPELLAFQ
RPTIPRNPKGFGYVTFMHLEALRQGTFIKDDTLLVRCEVSTRFDMGGLRKEGFQPRSTDAGV

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 PBS 缓冲体系，含 50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议

分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为 HEK293T 真核细胞表达系统制备的重组 TNF receptor-associated factor 6 (EC 2.3.2.27) (E3 ubiquitin-protein ligase TRAF6) (RING-type E3 ubiquitin transferase TRAF6)。蛋白产品适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学等科研场景。

蛋白功能：一种 E3 泛素连接酶，可与 UBE2N 和 UBE2V1 共同介导与 ECSIT、IKBKG、IRAK1、AKT1 及 AKT2 等蛋白质偶联的“Lys-63”连接的多聚泛素链的合成。还可介导游离/未锚定的多聚泛素链的泛素化，进而引发 MAP3K7 激活。可激活 NF-kappa-B 和 JUN。似乎还在树突状细胞（DCs）的成熟和/或激活中发挥作用。可在 B 淋巴细胞中抑制 c-Myb 介导的转录激活。一种衔接蛋白，似乎参与 TNF 受体、IL-1 受体及 IL-1 受体启动的信号转导过程。可响应 RANK-L 刺激，通过介导衔接蛋白复合物 1（AP-1）与 NF-kappa-B 的激活来调控破骨细胞分化。可与 MAP3K8 共同介导 CD40 信号，激活 B 细胞和巨噬细胞中的 ERK，因此可能参与免疫球蛋白生成的调控。作为 JNK 及 NF-kappa-B 信号通路的调控因子，可启动“Lys-63”-/“Lys-48”-连接的异质性分支泛素链的组装，该链随后可被 TAB2 识别：TRAF6 催化生成初始的“Lys-63”连接的多聚泛素链，随后由 HUWE1 通过“Lys-48”连接的多聚泛素进行分支化。“Lys-63”-/“Lys-48”-连接的分支泛素链可保护“Lys-63”连接免受 CYLD 的去泛素化作用。还可通过泛素化 LAT 参与 TCR 信号转导。

亚细胞定位：细胞质。细胞质，细胞皮层。细胞核。脂滴。注：RSAD2/viperin 将其招募至脂滴。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。