重组小鼠 TGFR2 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP51667

蛋白名称：TGF-beta receptor type-2 (TGFR-2) (EC 2.7.11.30) (TGF-beta type II receptor) (Transforming growth factor-beta receptor type II) (TGF-beta receptor type II) (TbetaR-II)

别名：Tgfbr2

UniProt 编号：Q62312

UniProt 链接：www.uniprot.org/uniprotkb/Q62312/entry

种属来源：小鼠

表达系统：HEK293T 真核细胞表达系统

序列长度：567 AA

分子量：64 KD

蛋白标签：C 端/His6

二、氨基酸序列

MGRGLLRGLWPLHIVLWTRIASTIPPHVPKSVNSDVMASDNGGAVKLPQLCKFCDVRLSTCDNQKS
CMSNCSITAICEKPHEVCVAVWRKNDKNITLETVCHDPKLTYHGFTLEDAASPKCVMKEKKRAGETF
FMCACNMEECNDYIIFSEEYTTSSPDLLLVIIQVTGVSLLPPLGIAIAVIIIFYCYRVHRQQKLSPSWESS
KPRKLMDFSDNCAIILEDDRSDISSTCANNINHNTELLPIELDTLVGKGRFAEVYKAKLKQNTSEQFET
VAVKIFPYEEYSSWKTEKDIFSDINLKHENILQFLTAEERKTELGKQYWLITAFHAKGNLQEYLTRHVIS
WEDLRKLGSSLARGIAHLHSDHTPCGRPKMPIVHRDLKSSNILVKNDLTCCLCDFGLSLRLDPTLSVD
DLANSGQVGTARYMAPEVLESRMNLENVESFKQTDVYSMALVLWEMTSRCNAVGEVKDYEPPFGS
KVREHPCVESMKDSVLRDRGRPEIPSFWLNHQGIQIVCETLTECWDHDPEARLTAQCVAERFSELE
HPERLSGRSCSQEKIPEDGSLNTTK

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 PBS 缓冲体系，含 50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为 HEK293T 真核细胞表达系统制备的重组 TGF-beta receptor type-2 (TGFR-2) (EC 2.7.11.30) (TGF-beta type II receptor) (Transforming growth factor-beta receptor type II) (TGF-beta receptor type II) (TbetaR-II)。蛋白产品适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学等科研场景。

蛋白功能：一种跨膜丝氨酸/苏氨酸激酶，可与 TGF-beta I 型丝氨酸/苏氨酸激酶受体 TGFBR1 共同构成 TGF-beta 细胞因子 TGFB1、TGFB2 和 TGFB3 的非泛特异性受体。它将 TGFB1、TGFB2 和 TGFB3 信号从细胞表面转导至细胞质，因此可调控多种生理及病理过程，包括上皮细胞和造血细胞的细胞周期阻滞、间充质细胞增殖与分化的调控、伤口愈合、细胞外基质生成、免疫抑制以及癌变。由 2 个 TGFBR1 分子和 2 个 TGFBR2 分子对称结合于细胞因子二聚体所构成的受体复合物的形成，会导致组成型激活的 TGFBR2 对 TGFBR1 进行磷酸化并使其活化。活化的 TGFBR1 会磷酸化 SMAD2，使其从受体上解离并与 SMAD4 相互作用。随后 SMAD2-SMAD4 复合物被转运至细胞核，在该处调控 TGF-beta 调控基因的转录。这构成了经典的、依赖 SMAD 的 TGF-beta 信号级联反应。（通过相似性推测）也参与非经典的、不依赖 SMAD 的 TGF-beta 信号通路；[亚型 RII-1]：具有转化生长因子β激活的受体活性；[亚型 RII-2]：具有转化生长因子β激活的受体活性。

亚细胞定位：细胞膜；单次跨膜 I 型膜蛋白。膜脂筏。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。