重组人 CCL24 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP50132

蛋白名称：C-C motif chemokine 24 (CK-beta-6) (Eosinophil chemotactic protein 2) (Eotaxin-2) (Myeloid progenitor inhibitory factor 2) (MPIF-2) (Small-inducible cytokine A24)

别名：CCL24, MPIF2, SCYA24

UniProt 编号：O00175

UniProt 链接：www.uniprot.org/uniprotkb/O00175/entry

种属来源：人

表达系统：HEK293T 真核细胞表达系统

序列长度：119 AA

分子量：13 KD

蛋白标签：C 端/His6

二、氨基酸序列

MAGLMTIVTSLLFLGVCAHHIIPTGSVVIPSPCCMFFVSKRIPENRVVSYQLSSRSTCLKAGVIFTTKK
GQQFCGDPKQEWVQRYMKNLDAKQKKASPRARAVAVKGPVQRYPGNQTTC

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 PBS 缓冲体系，含 50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为 HEK293T 真核细胞表达系统制备的重组 C-C motif chemokine 24 (CK-beta-6) (Eosinophil chemotactic protein 2) (Eotaxin-2) (Myeloid progenitor inhibitory factor 2) (MPIF-2) (Small-inducible

cytokine A24)。蛋白产品适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学等科研场景。

蛋白功能：对静息 T 淋巴细胞和嗜酸性粒细胞具有趋化作用（PubMed:9104803, PubMed:9365122）。对中性粒细胞的趋化活性较低，对单核细胞和活化淋巴细胞则无趋化活性（PubMed:9104803, PubMed:9365122）。可强力抑制多能造血祖细胞系的集落形成（PubMed:9104803, PubMed:9365122）。可与 CCR3 结合（PubMed:9104803, PubMed:9365122）。

亚细胞定位：分泌型。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。