重组小鼠 DSRAD 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP51858

蛋白名称：Double-stranded RNA-specific adenosine deaminase (DRADA) (EC 3.5.4.37) (RNA adenosine deaminase 1)

别名：Adar

UniProt 编号：Q99MU3

UniProt 链接：www.uniprot.org/uniprotkb/Q99MU3/entry

种属来源：小鼠

表达系统：HEK293T 真核细胞表达系统

序列长度：1178 AA

分子量：130 KD

蛋白标签：C 端/His6

二、氨基酸序列

MSQGFRGPTGVFPHQTQSYLDPSHEHSKWRYPQPQGPESYPRSFQLQQIEFLKGRLPEAPLIGIQT
QSLPPFLPGHWPRFPGPPAQDRQLEIWEFPRSVTLRNQGFHIGPPLPPPHSRGTPWRGADGLCSH
FRELSISQSPEQKVLNRLEELGEGKATTAHVLARELRIPKRDINRILYSLEKKGKLHRGRGKPPLWSL
VPLSQAWTQPPGVVNPDSCIQEFPRGEPGLDSEDGDPASDLEGPSEPLDMAEIKEKICDYLFNVSN
SSALNLAKNIGLTKARDVTSVLIDLERQGDVYRQGATPPIWYLTDKKRERLQMKRSTHSAPAPTPTA
VPEATRSPSFPACHPPPAGASSSVAASKRVENGQEPAIKHESRHEARPGPMRLRPHAYHNGPSRA
GYVASENGQWATDDIPDNLNSIHTAPGEFRAIMEMPSFYSPTLPRCSPYKKLTECQLKNPVSGLLEY
AQFTSQTCDFNLIEQSGPSHEPRFKFQVVINGREFPPAEAGSKKVAKQDAAVKAMAILLREAKAKDS
GQPEDLSHCPMEEDSEKPAEAQAPSSSATSLFSGKSPVTTLLECMHKLGNSCEFRLLSKEGPAHDP
KFQYCVAVGAQTFPPVSAPSKKVAKQMAAEEAMKALQEEAASSADDQSGGANTDSLDESMAPNKI
RRIGELVRYLNTNPVGGLLEYARSHGFAAEFKLIDQSGPPHEPKFVYQAKVGGRWFPAVCAHSKKQ
GKQDAADAALRVLIGESEKAEQLGFAEVTPVTGASLRRTMLLLSRSPDAHPKTLPLSGSTFHDQIAM
LSHRCFNALTNSFQPSLLGRKILAAIIMKRDPEDMGVVVSLGTGNRCVKGDSLSLKGETVNDCHAEII
SRRGFIRFLYSELMKYNHHTAKNSIFELARGGEKLQIKKTVSFHLYISTAPCGDGALFDKSCSDRAVE
STESRHYPVFENPKQGKLRTKVENGEGTIPVESSDIVPTWDGIRLGERLRTMSCSDKILRWNVLGLQ
GALLTHFLQPVYLKSVTLGYLFSQGHLTRAICCRVTRDGKAFEDGLRYPFIVNHPKVGRVSVYDSKR
QSGKTKETSVNWCMADGYDLEILDGTRGTVDGPGKELSRVSKKNIFLQFKKLCSFRARRDLLQLSY
GEAKKAARDYDLAKNYFKKSLRDMGYGNWISKPQEEKNFYLCPVPND

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 PBS 缓冲体系，含 50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为 HEK293T 真核细胞表达系统制备的重组 Double-stranded RNA-specific adenosine deaminase (DRADA) (EC 3.5.4.37) (RNA adenosine deaminase 1)。蛋白产品适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学等科研场景。

蛋白功能：催化双链 RNA（dsRNA）中腺苷水解脱氨生成肌苷的反应，这一过程被称为 A-to-I RNA 编辑。该过程可通过多种方式影响基因的表达与功能：由于翻译机制会将肌苷识别为鸟苷，因此可通过改变密码子进而改变蛋白质的氨基酸序列，影响 mRNA 翻译；通过改变剪接位点识别序列影响 pre-mRNA 剪接；通过改变核酸酶识别相关序列影响 RNA 稳定性；在 RNA 病毒基因组的情况下，可通过病毒 RNA 复制过程中的序列改变影响遗传稳定性；还可影响依赖 RNA 结构的活性，例如 microRNA 的生成或靶向作用，以及蛋白质-RNA 相互作用。

该物质既可编辑病毒 RNA，也可编辑细胞 RNA，且可在多个位点对 RNA 进行编辑（超编辑）或在特定位点进行编辑（位点特异性编辑）。其细胞 RNA 底物包括：膀胱癌相关蛋白（BLCAP）、谷氨酸神经递质受体（GRIA2）、5-羟色胺神经递质受体（HTR2C）以及 GABA 受体（GABRA3）。对编码这些蛋白质的转录本进行位点特异性 RNA 编辑会导致氨基酸替换，进而改变它们的功能活性。

它在 GRIA2 Q/R 位点的编辑水平较低，但在 R/G 位点和 HOTSPOT1 处可高效编辑。它不影响多瘤病毒的复制，但可抵御病毒诱导的细胞病变效应。它是胚胎发育和细胞存活所必需的，并且在造血干细胞的维持中发挥关键作用。

亚细胞定位：[亚型 1]：细胞质。细胞核、核仁。注：从 Met-1 起始的长型主要定位于细胞质。可在细胞质与细胞核之间穿梭。；[亚型 2]：细胞质。细胞核、核仁。注：从 Met-1 起始的长型主要定位于细胞质。；[亚型 3]：细胞核、核仁。注：从 Met-519 起始的短型仅定位于核仁。；[亚型 4]：细胞核、核仁。注：从 Met-519 起始的短型仅定位于核仁。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。