重组小鼠 ORAI3 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP52139

蛋白名称：Protein orai-3 (Transmembrane protein 142C)

别名：Orai3, Tmem142c

UniProt 编号：Q6P8G8

UniProt 链接：www.uniprot.org/uniprotkb/Q6P8G8/entry

种属来源：小鼠

表达系统：HEK293T 真核细胞表达系统

序列长度：290 AA

分子量：31 KD

蛋白标签：C 端/His6

二、氨基酸序列

MKGGEGDTGEQAPLNPEVDSPAGSATYREFVHRGYLDLMGASQHSLRALSWRRLYLSRAKLKASS
RTSALLSGFAMVAMVEVQLENDHEYPPGLLVAFSACTTVLVAVHLFALMVSTCLLPHIEAVSNIHNLN
SVHQSPHQRLHRYVELAWGFSTALGTFLFLAEVVLVGWVKFVPIGAPMGKPAPVVPMSQVPPVTVS
LSLASNLTPSSASITTSQQPSKACPPRQVCDSAHGPGWQAAMASTAIMVPVGLVFMAFALHFYRSL
VAHKTDRHKQELEELSRLQGELQAV

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 PBS 缓冲体系，含 50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为 HEK293T 真核细胞表达系统制备的重组 Protein orai-3 (Transmembrane protein 142C)。蛋白产品适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学等科研场景。

蛋白功能：质膜上两类主要内向整流 Ca(2+)通道的孔道形成亚基：Ca(2+)释放激活 Ca(2+)（CRAC）通道与花生四烯酸调控的 Ca(2+)选择性（ARC）通道。可与 ORAI1、ORAI2 组装形成六聚体 CRAC 通道，该通道在内质网 Ca(2+)库耗竭、且被 Ca(2+)传感器 STIM1 激活时介导 Ca(2+)内流，这一过程被称为库操纵性 Ca(2+)内流（SOCE）。不同的孔道亚基组合可能是 CRAC 通道具有不同时空特性及细胞类型特异性动力学的原因。ORAI1 主要参与介导持续性 Ca(2+)内流相关的 Ca(2+)平台形成，对胞质 Ca(2+)振荡而言非必需，而 ORAI2 与 ORAI3 则介导振荡模式。CRAC 通道组装于 Ca(2+)信号微区，在此区域 Ca(2+)内流与钙调蛋白、钙调磷酸酶信号相偶联，并通过 AKAP5 招募至 ORAI1 的 NFAT 转录因子被激活。CRAC 通道是 T 细胞中 Ca(2+)内流的主要通路，可通过激活 NFAT 依赖的细胞因子与趋化因子转录，促进针对病原体的免疫应答。可与 ORAI1 组装形成通道，响应炎症代谢物花生四烯酸或其衍生物白三烯 C4，介导不依赖于钙库的 Ca(2+)内流，对应的通道分别被称为 ARC 通道与 LRC 通道。

亚细胞定位：细胞膜；多次跨膜蛋白。注：钙库耗竭时与 STIM1 共定位。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。