重组大鼠 M3K7 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP52264

蛋白名称：Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 (EC 2.7.11.25)

别名：Map3k7

UniProt 编号：P0C8E4

UniProt 链接：www.uniprot.org/uniprotkb/P0C8E4/entry

种属来源：大鼠

表达系统：HEK293T 真核细胞表达系统

序列长度：606 AA

分子量：67 KD

蛋白标签：C 端/His6

二、氨基酸序列

MSTASAASSSSSSSASEMIEAPSQVLNFEEIDYKEIEVEEVVGRGAFGVVCKAKWRAKDVAIKQIESE
SERKAFIVELRQLSRVNHPNIVKLYGACLNPVCLVMEYAEGGSLYNVLHGAEPLPYYTAAHAMSWCL
QCSQGVAYLHSMQPKALIHRDLKPPNLLLVAGGTVLKICDFGTACDIQTHMTNNKGSAAWMAPEVF
EGSNYSEKCDVFSWGIILWEVITRRKPFDEIGGPAFRIMWAVHNGTRPPLIKNLPKPIESLMTRCWSK
DPSQRPSMEEIVKIMTHLMRYFPGADEPLQYPCQYSDEGQSNSATSTGSFMDIASTNTSNKSDTNM
EQVPATNDTIKRLESKLLKNQAKQQSDSGRLSLGASRGSSVESLPPTSEGKRMSADMSEIEARIVAT
TAYTKPKRGHRKTASFGNILDVPEIVISGNGQPRRRSIQDLTVTGTEPGQVSSRSSSPSVRMITTSGP
TSEKPARSLPWTPDDSTDTNGSDNSIPMAYLTLDHQLQPLAPCPNSKESMAVFEQHCKMAQEYMK
VQTEIALLLQRKQELVAELDQDEKDQQNTSRLVQEHKKLLDENKSLSTYYQQCKKQLEVIRSQQQKR
QGTS

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 PBS 缓冲体系，含 50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为 HEK293T 真核细胞表达系统制备的重组 Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 (EC 2.7.11.25)。蛋白产品适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学等科研场景。

蛋白功能：一种丝氨酸/苏氨酸激酶，作为 MAP 激酶信号转导通路的核心必需组分。在环境变化引发的细胞应答级联反应中发挥重要作用。介导 TRAF6、多种细胞因子（包括白细胞介素-1 (IL-1)、转化生长因子-β (TGFB)、BMP2 和 BMP4 等 TGFB 相关因子）、Toll 样受体 (TLR)、肿瘤坏死因子受体 CD40 以及 B 细胞受体 (BCR) 的信号转导。一旦被激活，可通过磷酸化并激活 MAP2K1/MEK1、MAP2K3/MKK3、MAP2K6/MKK6、MAP2K7/MKK7 等多种 MAP 激酶激酶，作为上游激活因子启动 MKK/JNK 信号转导级联与 p38 MAPK 信号转导级联。上述 MAP2Ks 进而激活 p38 MAPK 与 c-Jun 氨基末端激酶 (JNKs)；p38 MAPK 与 JNK 通路共同调控转录因子激活蛋白-1 (AP-1)。不依赖于 MAP2Ks 与 p38 MAPKs，可通过促进 I-κB 激酶 (IKK) 核心复合物的激活，作为 NF-κB 的关键激活因子发挥作用。从机制上，其通过 TAB2/MAP3K7IP2 与 TAB3/MAP3K7IP3 被招募至 RIPK2 与 IKBKG/NEMO 的多聚泛素链，催化 IKK 复合物组分 IKBKB/IKKB 的磷酸化与激活，进而引发 NF-κB 激活。在渗透压应激信号通路中，主要参与 MAPK8/JNK1 的激活，但不参与 NF-κB 的激活。可增强 TRIM5 的衣壳特异性限制活性。可在 RIPK1 的 Ser-321 位点使其磷酸化，该修饰正向调控 RIPK1 与 RIPK3 的相互作用以促进坏死性凋亡，同时负向调控 RIPK1 的激酶活性及其与 FADD 的相互作用以介导细胞凋亡。在 cGAMP 激活的应答过程中使 STING1 磷酸化，促进 STEEP1 与 STING1 的结合以及 STING1 向 COPII 囊泡的转运。

亚细胞定位：细胞质。细胞膜；外周膜蛋白；细胞质侧。注：尽管大部分 MAP3K7/TAK1 位于胞质中，但当其与 TAB1/MAP3K7IP1 及 TAB2/MAP3K7IP2 形成复合物时，也会定位于细胞膜。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。