# 重组大鼠 LITAF 蛋白产品说明书

## 一、产品基础信息

**货号：**REP52262

**蛋白名称**：Lipopolysaccharide-induced tumor necrosis factor-alpha factor homolog (LPS-induced TNF-alpha factor homolog) (Estrogen-enhanced transcript protein 1) (Eet-1)

**别名**：Litaf

**UniProt 编号**：P0C0T0

**UniProt 链接**：www.uniprot.org/uniprotkb/P0C0T0/entry

**种属来源**：大鼠

**表达系统**：HEK293T 真核细胞表达系统

**序列长度**：161 AA

**分子量**：17 KD

**蛋白标签**：C 端/His6

## 二、氨基酸序列

MSAPGPYQAAAGPSVMPTAPPTYEETVGVNSYYPTPPAPQPGPATGLITGPDGKGMNPPSYYTQP
VPVPNANAIAVQTVYVQQPISFYDRPIQMCCPSCNKMIVTQLSYNAGALTWLSCGSLCLLGCVAGCC
FIPFCVDALQDVDHYCPNCKALLGTYKRL

## 三、缓冲液体系

**液体剂型**：基于 PBS 缓冲体系，含 50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

**冻干粉剂型**：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 PBS 缓冲体系。

## 四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

## 五、产品简介

本产品为 HEK293T 真核细胞表达系统制备的重组 Lipopolysaccharide-induced tumor necrosis factor-

alpha factor homolog (LPS-induced TNF-alpha factor homolog) (Estrogen-enhanced transcript protein 1) (Eet-1)。蛋白产品适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学等科研场景。

蛋白功能：参与内体蛋白运输及靶向蛋白的溶酶体降解过程。参与将内吞的 EGFR 和 ERGG3 靶向至溶酶体降解，从而帮助下调下游信号级联反应。协助将 ESCRT 复合物组分 TSG101、HGS 和 STAM 招募至细胞质膜。可能通过与 NEDD4 相互作用参与调控蛋白降解。也可能在细胞核内参与调控基因表达。可（体外）结合 DNA，并可能在细胞核内与 STAT6 协同作用，调控多种细胞因子的表达。可调控多种细胞因子的表达，例如 TNF、CCL2、CCL5、CXCL1、IL1A 和 IL10。

亚细胞定位：细胞质。细胞核。溶酶体膜；外周膜蛋白；胞质侧。早期内体膜。晚期内体膜。内体膜；外周膜蛋白；胞质侧。细胞膜；外周膜蛋白；胞质侧。高尔基体膜。注：与溶酶体、早期和晚期内体的膜相关。可从细胞质转运至细胞核。在有髓施万细胞的施密特-兰特曼切迹和结区中被检测到。

## 六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。